

대장 내시경 검사 동의서

대장내시경은 대장암의 조기진단에 있어 가장 정확한 검사로 지름 1cm 정도 되는 긴 관으로 항문을 통하여 항문, 직장, 결장, 맹장을 직접 보는 검사입니다. 내시경 검사에서는 드물지만 합병증 발생의 가능성이 있습니다

대장 용종제거술

대장내시경 검사 중 용종이 발견될 경우 올가미를 이용하여 용종을 제거하는 시술을 하게 됩니다. 환자분은 전혀 통증을 느끼지 않으나 드물게 용종을 제거하는 중이나 시술 후 가벼운 부작용 또는 천공의 합병증이 올 수도 있습니다. 합병증이 발생하면 응급처치를 요 하며 긴급 수술이 필요할 수도 있습니다. 심한 통증, 출혈, 구토, 고열 등이 있을 때는 지체없이 알려주시기 바랍니다. 용종절제를 시행한 경우는 개수에 따라 추가비용이 발생되며, 크기나 모양에 따라 당일 용종절제가 불가능할 수 있습니다.

♠ 만일 용종이 발견된다면 즉석에서 용종절제술을 시행하는데 동의하십니까?

예 / 아니오

대장 조직검사

정확한 진단을 위하여 의사의 판단에 따라 의심되는 부분에 대한 조직검사를 시행하는 경우가 있습니다. (대장 조직검사 미실시로 인해 발생하는 진단적 오류는 본원이 책임지지 않습니다.) 조직검사를 시행한 경우는 개수에 따라 추가비용이 발생됩니다.

♠ 대장 내시경 검사 중 이상소견이 있을 경우 대장 조직검사를 시행하는데 동의하십니까?

예 / 아니오

본인은 위 내시경 검사 전 위의 내용을 숙지하였으며 부작용 발생시 이의를 제기하지 않을 것을 서약하며
자의에 의해 검사를 신청합니다

■ 신청인:

(인)

■ 주민등록번호:

-

20 년 월 일

의식하 진정(수면) 내시경 검사 동의서

의식하 진정(수면) 내시경 검사는 주사로 약물을 투여하여 환자를 어느 정도의 진정상태에 도달하게 한 후 검사를 하는 것으로 환자를 마취한 상태로 하는 검사는 아니며 ‘환자의 협조가 가능한 진정상태’에서 검사를 합니다. 약물에 잘 반응하지 않은 경우에는 검사가 불충분하게 될 수 있으며 수면유도가 안 될 수도 있습니다. 혼자 않으나 호흡정지, 심장정지, 치명적인 간 손상, 혼수 내지는 사망에 이를 수 있는 등 심각한 합병증이 발생할 수 있습니다.

수면내시경 검사시 주의사항

- ☞ 수면내시경검사 후에는 완전한 회복을 위하여 **안정**이 필요합니다.
- ☞ 혈관주사에 의해 진정상태에 도달하며 개인차가 크지만 평균 30분 지속되면 드물게 2시간 이상 지속될 수 있습니다.
- ☞ 검사 후 **3~4시간 정도는 충분한 휴식**을 취하셔야 하며 검사당일 운전, 기계조작, 운동, 중요한 결정 및 회의 참석 등은 금합니다.(위험)
- ☞ 수면내시경 검사 후에는 안정이 필요하며 낙상 등의 위험을 예방하기 위해서 보호자분께서 반드시 동행하셔야 합니다.

본인은 위 내시경 검사 전 위의 내용을 숙지하였으며 부작용 발생시 이의를 제기하지 않을 것을 서약하며
자의에 의해 검사를 신청합니다

■ 신청인:

(인)

■ 주민등록번호:

-

20 년 월 일

대장내시경 검사 안내문

1

대장내시경검사는 내시경기를 항문을 통하여 삽입하고 소장입구까지 진행하며 장의 염증, 궤양, 용종, 악성종양 등의 다양한 질환을 직접 육안으로 관찰하는 것을 목적으로 하며 대략 20~30분 정도 소요되며 필요에 따라 조직검사를 시행하는 검사입니다.

대장내시경의 검사 전 주의사항

- 1) 당뇨가 있어서 약물치료나 인슐린 주사를 맞고 계시는 분은 금식으로 인해 저혈당이 올 수 있으므로 주치의와 상의 후 결정하시기 바랍니다.
- 2) 혈압약을 드시는 분은 검진 당일 최소량의 물로 꼭 복용하시고 오십시오.
- 3) 여성분은 임신 및 임신가능성이 있으신 분은 검사가 불가하오니 일자를 변경해주시기 바랍니다.
- 4) 여성분은 검진 당일 메니큐어나 립스틱은 지우고 오시기 바랍니다. (수면 내시경 검사시 관찰이 필요합니다)
- 5) 귀금속 (목걸이,반지,귀걸이,시계등)은 착용하지 말고 오시기 바랍니다. (대장 용종 절제시 감전이나 화상 등의 우려가 있습니다)
- 6) 검사 후 7일 정도는 비행기 탑승 및 과격한 운동이나 과식,과음 등을 삼가시기 바랍니다.
- 7) 반드시 하제를 모두 복용하고 내원하시기 바랍니다. 모두 복용하지 않았을 경우 검사진행이 중단 되거나 조직검사 등이 불가능할 수 있습니다.

2

대장검사를 위한 약 복용방법

검사
7일전

항응고제 [아스피린](어린이 아스피린 포함), 아스트리스, 와파린(쿠마린), 티클로피딘, 클로피도그렌, 디피리다몰 등]를 복용하시는 경우 조직검사나 용종절제시 출혈의 위험이 있어 약을 처방해 주신 의사선생님과 반드시 사전 협의 후 검진 전 약 1주 정도는 복용을 중단하셔야 되며, 사전에 연락을 꼭 부탁드립니다.

*특히 혈압약을 드시는 분은 혈압약과 함께 아스피린이 포함되어 있는지 확인바랍니다.

검사
3일전

씨있는 과일(딸기, 수박, 참외, 키위, 포도 등), 해조류(김, 미역, 다시마 등), 잡곡류(현미, 흑미, 검정콩, 깨 등), 섬유질이 많고 질긴 음식(나물류, 뿐리음식, 고기류 등), 경구철분제 등은 드시지 마십시오.

검사
1일전

검사전날 아침 – 점심은 가볍게 흰죽(소금, 간장) 정도 드시고, 식사 후에는 물, 꿀물, 과일주스(사과, 레몬에이드, 자동 등) 이온음료를 제외하고는 금식하십시오. 반찬은 드시지 마십시오.

- ① 검사전날 저녁 6시에 **둘코락스(노란알약) 2알**을 드십시오
- ② **피코라이트 1포**를 반드시 물 150~200ml에 넣고 완전히 녹인 후 **복용**하십시오
(※ 주의- 이 약은 반드시 물에 녹여서 복용 하십시오)
- ③ 저녁 6시에 1포, 저녁 9시에 1포, 밤 12시에 1포 마시면 됩니다.(총 3포)
※ 주의할 점은 1포 복용시마다 물을 1리터 이상 마셔야 됩니다. 물 드시는 방법은 약 복용하시고 30분 이후부터 30분 간격으로 250ml씩 4회 마시고, 총 3리터 이상의 물을 마셔야 됩니다. (소량의 물 복용시 장청소 불량으로 검사 중단 될 수 있습니다.)

3

대장내시경의 검사 후 주의사항

- ▶ 대장에 공기를 주입하는 검사이므로 검사종료 후 간혹 하복부의 불편감, 팽만감이 들 수 있습니다. 이 때에는 **걷거나 배를 따뜻하게 해주어 방귀를 펌으로서 불편감이 해소**될 수 있습니다.
- ▶ 진통제 때문에 약간 어지러울 수 있습니다. 수면내시경을 한 경우에는 회복 후에도 간혹 어지럼기 때문에 **운전이나 고도의 집중을 요하는 작업은 피하세요**. 보호자와 함께 귀가하는 것이 좋습니다.
- ▶ 검사 종료 후부터 수일 내 부작용으로 출혈 증상(어지러움, 혈변), 천공 증상(심한 복통, 복부 팽만감, 식은 땀, 호흡곤란)이 있을 경우 응급실로 가셔야 합니다.
- ▶ 조직검사를 한 경우에는 대변에 피가 조금 섞여 나올 수 있습니다만 보통은 곧 멎춥니다. 만약 계속해서 피가 나오는 경우에는 **병원으로 연락**해 주십시오.